

**Piano di emergenza  
Ipoglicemia**

**Ipoglicemia lieve-moderata**

**Sintomi:**

Pallore, tremore, cefalea, sudorazione fredda, agitazione, confusione, debolezza, linguaggio stentato, fame, cambiamento dell'umore, incapacità a concentrarsi, annebbiamento della vista.

**Interventi:**

- Misurare la glicemia e se inferiore a 100 mg%: far ingerire zuccheri a rapido assorbimento (succo di frutta, bevanda zuccherata) e carboidrati (pane, crackers).
- Dopo 10 minuti ripetere la misurazione della glicemia e se inferiore a 60 mg% ripetere la somministrazione di zuccheri.

**Ipoglicemia grave**

**Sintomi:**

Perdita di coscienza, stato convulsivo, incapacità a deglutire con rischio di soffocamento

**Interventi:**

- Il docente presente in aula.
  1. avviserà immediatamente il 118;
  2. chiederà ausilio al collaboratore scolastico del piano;
  3. chiamerà nell'ordine le seguenti figure, autorizzate alla somministrazione di farmaci:  
Ins./sig. .... Responsabile del primo soccorso  
o, in caso di assenza:  
Ins./sig. .... Responsabile del primo soccorso  
o, in caso di assenza:  
Ins./sig. .... figura autorizzata a somministrare farmaci  
o, in caso di assenza:  
Ins./sig. .... figura autorizzata a somministrare farmaci
  4. avviserà i genitori dell'alunno;
  5. affiderà gli alunni al/ai docenti della classe .....
- l'incaricato della somministrazione:
  1. rileverà i valori glicemici;
  2. preleverà il glucagone conservato presso .....
  3. ne inietterà entro 5-10 minuti dalla comparsa dei sintomi, 1 fiala (oppure ½ fiala per soggetti di peso inferiore a 25 Kg) per intramuscolo (coscia, gluteo o braccio).

La somministrazione potrà essere effettuata dallo stesso insegnante di classe, se preventivamente autorizzato.